

Setter Irlandés

Todo lo que tu compañero necesita, en un solo lugar



01

PARTE I • FUNDAMENTOS PARA CUALQUIER PERRO

Preparar la llegada a casa

La mayoría de las guías sobre perros empiezan el día en que el cachorro ya está en tus brazos. Es un error de secuencia que tiene un costo real: las primeras 48 horas en un hogar nuevo son, estadísticamente y en la experiencia de cualquier veterinario o entrenador con años de trabajo, uno de los momentos de mayor riesgo de accidentes evitables y de decisiones tomadas con las prisas del entusiasmo —comprar lo que no hace falta, no comprar lo que sí, y descubrir el primer peligro de la casa cuando el cachorro ya lo tiene en la boca. Este capítulo existe para que la primera vez que abras la puerta con tu nuevo compañero en brazos, la casa ya esté lista para recibirlo — no para improvisar sobre la marcha.

Pet-proofing: cables, plantas, productos de limpieza, objetos pequeños

Es tentador pensar en la seguridad del hogar como sentido común aplicado con calma — y en gran medida lo es. Pero vale la pena entender la magnitud real del problema antes de tratarlo como un trámite menor: un estudio epidemiológico de gran escala realizado en Japón, que analizó los registros de seguro de salud de más de 250.000 perros asegurados durante un año, encontró que la ingestión de cuerpos extraños —objetos que un perro traga y que no pueden digerirse ni pasar con normalidad por el tracto digestivo— afectó al 4,4% de los cachorros menores de un año, una tasa significativamente más alta que el 1,7% observado en la población canina general.

Entender por qué el riesgo es tan alto en esta etapa específica ayuda a tomarlo en serio sin caer en la paranoia: los cachorros exploran el mundo predominantemente con la boca, de la misma manera en que un bebé humano se lleva objetos a la boca en su primera infancia. Combina esa tendencia exploratoria con un sistema digestivo todavía en desarrollo, de menor diámetro que el de un adulto, y el resultado es una ventana de vulnerabilidad real que dura, aproximadamente, hasta que termina la fase más intensa de exploración oral y masticación asociada a la dentición.

La lista de objetos que terminan en cirugías de emergencia sorprende por lo cotidiana que es: calcetines y ropa interior, huesos de fruta, tapas de botella, piedras del jardín, juguetes de goma masticados hasta desprender piezas pequeñas, hilo o cordón, y restos de comida o envoltorios sacados de la basura. La ubicación más común de la obstrucción resultante es el intestino delgado, precisamente el segmento de menor diámetro de todo el tracto digestivo.

Trasladado a una acción concreta, los cables eléctricos deben recogerse o cubrirse con canaletas; los productos de limpieza, medicamentos y cosméticos necesitan un armario alto o con seguro infantil real; los objetos pequeños del